

BRONDBY KOMMUNE

Ældre og Omsorg

Udarbejdet af: Kirsten Vandsted, assisterende hjemmeplejeleder

Godkendt i Topledergruppen: Marts 2014

Ansvarlig: Centerleder Britta Pedersen

Revideret: Marts 2017 udviklingssygepl. Lisbeth Dam og centerleder Britta Pedersen. Maj 2019 af Susanne Elbæk

Lokalt tillæg: Ældrecentret Nygårds Plads sep 2019/spb

Revideres senest: Maj 2021

| Instruks: Akut blodsuktermåling efter rammedelegation | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|--|--|
| Målgruppe | Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i hjemmesygeplejen og på ældrecentrene i Brøndby Kommune | | | | |
| Formål | At sygeplejen er aktivt deltagende i at opspore og forebygge sygdom, samt agerer fagligt hensigtsmæssigt i akutte situationer | | | | |
| Mål | <ul style="list-style-type: none"> • At forværring i en borgers tilstand opspores tidligt • At blodsukkerværdi – sammen med øvrige observationer og målinger – danner baggrund for hensigtsmæssig lægefaglig handlingsbeslutning • At der hurtigt kan iværksættes adækvat behandling i hjemmet, så hospitalsindlæggelse evt. undgås | | | | |
| Hvornår måles blodsukker? | <p>Som led i tidlig opsporing af sygdomstegn må sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter efter rammedelegation af 2014 og ifølge kompetenceprofiler udføre blodsuktermåling hos borgere, der ikke er diagnosticerede diabetespatienter.</p> <p>Der måles blodsukkerværdi hos borgere med følgende symptomer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Højt blodsukker</th> <th>For lavt blodsukker</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse </td> </tr> </tbody> </table> | Højt blodsukker | For lavt blodsukker | <ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab | <ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse |
| Højt blodsukker | For lavt blodsukker | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab | <ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse | | | | |
| Normal blodsukker | <p>Normale blodsukkerværdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Hos personer under 80 år</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fastende blodsukker bør være 5-7 mmol/l ○ Ikke fastende blodsukker bør ligge mellem 5-10 mmol/l • <u>Hos personer over 80 år</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fastende blodsukker bør være 6-9 mmol/l ○ Ikke-fastende blodsukker bør være 6-12 mmol/l | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>Dokumentation</p> | <p>Blodsukkerværdien danner sammen med øvrige observationer og målinger baggrund for den fremadrettede indsats for borgeren. Behandlingsansvaret for borgeren påhviler fortsat den praktiserende læge eller anden læge, som varetager borgerens behandling.</p> <p>Blodsukker værdien dokumenteres i Nexus</p> |
| <p>Lokale tillæg</p> | <p>På Ældrecentret Nygårds Plads*</p> <p>Hvis BS værdier ligger uden for normalområdet skal læge kontaktes mhp hurtig iværksættelse af evt. intervention.</p> <p>Uden for praktiserende læges åbningstid kontaktes 1813.</p> |
| <p>Lovgrundlag Referencer Kilder</p> | <p>Autorisationsloven, lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011</p> <p>Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)</p> <p>Rammedelegation af 2014 i KMD-sag samt korrespondance omkring godkendelse. Vedlagt som bilag.</p> <p>*Marianne Olander sygeplejerske, Styrelsen for patientsikkerhed, ved Risikobaseret tilsyn 24/8 2018</p> |