

## **Tjekliste til den ordinerende læge når borger opstartes i IV-behandling i eget hjem via Akutteam Brøndby Hvidovre**

Såfremt en læge ønsker at opstarte en borger i IV-behandling, bosiddende i Brøndby eller Hvidovre Kommune, kontaktes Akutteamet.

**Lægen** er ansvarlig for følgende, som samtidig skal være beskrevet i en særskilt medcom/korrespondance, for at Akutteamet kan varetage opgaven:

1. At være til stede hos borgeren sammen med Akutteamet ved første og evt. anden indgift af IVantibiotika.
2. Behandlingsplan med forventet afslutningsdato og ordinationer på den medicin som varetages af Akutteamet.
3. Ved behandling, der kan medføre risiko for allergisk reaktion, skal der foreligge en ordination på anafylaksipakke (Tavegyl/Clemastin, Solu-Medrol og Adrenalin).
4. Skal der følges op på behandlingen med evt. blodprøver, i så fald hvilke? Hvem ser svar på prøverne? Akutteamet kan f.eks tage en kapillær CRP og Leuk diff.
5. Hvilke observationer skal foretages i hjemmet og hvor hyppigt? Hvis der ønskes måling af TOBS, bedes det angives, samt ved hvilke afvigelser Akutteamet skal reagere.
6. Navn(e) samt tlf. numre på ansvarlig læge, der kan kontaktes i dagstiden og i vagter på alle dage (inkl. søndag og helligdage)
7. Tage stilling til eventuel opfølgning efter endt behandling.
8. FMK skal ajourføres og afstemmes, og relevante recepter lægges på serveren.
9. Patienten/borgeren er informeret om behandlingen og er af lægen vurderet til at kunne samarbejde om behandlingen i eget hjem.

### **Lægen og Akutteamet koordinerer følgende**

- Kan borger selv afhente medicin, inkl. anafylaksipakke, kan pårørende hjælpe eller skal det sendes hjem til borger
- Hvilken IV-administrationsform skal anvendes og har akutteamet kompetencer til at anlægge/pleje/observere denne
- Gennemgå om Akutteamet har de utensilier som skal bruges eller m de skal skaffes fra apotek/hospital, f.eks:
  - Dropsæt
  - Pumpe, hvis medicinen skal gives over Pumpe
  - Posiflush NaCl forfyldte sprøjter 10 ml
  - Utensilier til brug ved skift af forbindelse iflg. VIP-vejledning
  - Injektionsmembraner (hvis der anvendes specielle, fx til PICC-Line)
  - Infusionsvæske
  - IV-antibiotika til behandling
  - NaCl og Sterilt vand og sprøjter (10 eller 20 ml) og hvis muligt overføringskanyle så antibiotika kan blandes i lukket system