

## Injektion Adrenalin til brug i tilfælde af akut allergisk chok

**Adrenalin medbringes ved alle injektioner**, bortset fra insulin.

### Symptomer på lettere allergisk reaktion:

Paræstesier (prikkende, snurrende, sovende fornemmelse) i læber, arme og ben.  
Eventuelt lokalt ødem eller udslet.

### Symptomer på akut allergisk shock:

Cyanose (blåfarvning af læber/ fingre), åndedrætsbesvær evt. stigende til en tilstand der minder om status astmaticsus, endende med udsættende respiration og puls.

### Andre symptomer:

Blodtryksfald, pulsstigning, stigning til u-følelig puls, bevidstløshed og åndedrætsstop.

<b>Behandling</b>	<p><b>Behandling af lettere allergiske reaktioner:</b> Lettere reaktioner observeres, rapporteres straks til læge/ vagtlæge, og det aftales med læge om det skal noteres som Cave.</p> <p><b>Behandling af akut allergisk chok:</b> Der skal <u>straks</u> gives injektion med adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml.</p> <p>Injektionen gives dybt intramuskulært, omkring det sted hvor det allergifremkaldende præparat er givet.</p> <p>Dosis til voksne er 0,5 mg adrenalin = 0,5 ml adrenalin injektionsvæske*.</p> <p>Umiddelbart herefter kontaktes læge, eller om nødvendigt rekvireres ambulance på <b>112</b>. Sygeplejerske/ Ansvarshavende informeres.</p> <p>Hvis tilstanden ikke bedres væsentligt inden for nogle minutter, gentages behandlingen.</p>
-------------------	--

Se lokal instruks: NP4.3.1 Adrenalin injektion i tilfælde af akut allergisk shock