

BRONDBY KOMMUNE**Ældre og Omsorg****Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerskerne****Godkendt i Topledergruppen den:** Marts 2014**Ansvarlig: Marianne Strømsted****Revideret:** Marts 2017 udviklingssygepl. Susanne Elbæk. Maj 2019 af Susanne Elbæk, juni 2022 Sus. E.**Revideres senest:** Maj 2024

Instruks vedrørende: Akut blodsuktermåling efter rammedelegation					
Målgruppe	Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i hjemmesygeplejen og på ældrecentrene i Brøndby Kommune				
Formål	At sygeplejen er aktivt deltagende i at opspore og forebygge sygdom, samt agerer fagligt hensigtsmæssigt i akutte situationer				
Mål	<ul style="list-style-type: none"> • At forværring i en borgers tilstand opspores tidligt • At blodsukkerværdi – sammen med øvrige observationer og målinger – danner baggrund for hensigtsmæssig lægefaglig handlingsbeslutning • At der hurtigt kan iværksættes adækvat behandling i hjemmet, så hospitalsindlæggelse evt. undgås 				
Instruks	Som led i tidlig opsporing af sygdomstegn må sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter efter rammedelegation af 2014 og ifølge kompetenceprofiler udføre blodsuktermåling hos borgere, der ikke er diagnosticerede diabetespatienter.				
Hvornår måles blodsukker?	<p>Der måles blodsukkerværdi hos borgere med følgende symptomer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Højt blodsukker</th> <th>For lavt blodsukker</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse </td> </tr> </tbody> </table>	Højt blodsukker	For lavt blodsukker	<ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab 	<ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse
Højt blodsukker	For lavt blodsukker				
<ul style="list-style-type: none"> • Træthed • Tørst • Hyppig vandladning • Tab af appetit / kvalme • Vægttab 	<ul style="list-style-type: none"> • Sved • Rysten • Mathed • Hjertebanken • Svimmelhed • Hovedpine og kvalme • Koncentrationsbesvær • Kramper • Besvimelse 				
Normal blodsukker	<p>Normale blodsukkerværdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Hos personer under 80 år</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fastende blodsukker bør være 5-7 mmol/l 				

<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke fastende blodsukker bør ligge mellem 5-10 mmol/l • <u>Hos personer over 80 år</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fastende blodsukker bør være 6-9 mmol/l ○ Ikke-fastende blodsukker bør være 6-12 mmol/l <p>Blodsukkerværdien danner sammen med øvrige observationer og målinger baggrund for den fremadrettede indsats overfor borgeren. Behandlingsansvaret for borgeren påhviler fortsat den praktiserende læge eller anden læge, som varetager borgerens behandling.</p> <p>Blodsukker værdien dokumenteres i Nexus</p>
<p>Lokale tillæg</p>	
<p>Lovgrundlag Referencer Kilder</p>	<p>Autorisationsloven, lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011</p> <p>Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009</p> <p>Rammedelegation af 2014 i KMD-sag samt korrespondance omkring godkendelse. Vedlagt som bilag.</p>